

Vážení čtenáři, na stránkách Interní medicíny pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Vliv hormonální substituční léčby v menopauze na kardiovaskulární systém závisí na:

- a) délce trvání menopauzy
- b) celkovém kardiovaskulárním riziku pacientky
- c) typu gestagenu
- d) všech uvedených

2 U azbestózy je typické toto:

- a) obstrukční ventilační porucha
- b) skořápkové uzliny
- c) restrikční ventilační porucha a krepitus
- d) zvýšené riziko infekce *M. tuberculosis*

3 Horečka Ebola se mezi lidmi přenáší:

- a) vzdušnou cestou
- b) úzkým kontaktem s nemocným
- c) vektorem
- d) kontaminovanou vodou a potravinami

4 Které potravní doplňky mohou interferovat s užíváním warfarinu?

- a) koenzym Q10
- b) koenzym Q10 a omega-3 polynenasycené mastné kyseliny
- c) L arginin
- d) lecitin

5 Primárně preventivní implantace ICD se týkají především:

- a) pacientů s ICHS
- b) po prodělaném infarktu myokardu
- c) s nízkou ejekční frakcí levé srdeční komory
- d) v nižší funkční třídě NYHA (II a III)

6 V případě zahájení inzulínové terapie pacienta s diabetem 2 typu současnou terapií metforminem:

- a) ukončíme, ponecháme jen inzulínoterapii
- b) ponecháme, rovněž lze ponechat deriváty sulfonylurey
- c) ponecháme v maximálně tolerované dávce
- d) ukončíme, místo něj volíme k inzulínovému režimu pioglitazon

7 Kdy pacientům doporučujeme rehabilitaci pomocí biofeedbacku?

- a) vždy, když můžeme předpokládat dobrou spolupráci s pacientem
- b) pouze před a po chirurgickém výkonu
- c) při anismu a dyssynergii svalů pánevního dna, u inkontinence, dále se orientujeme dle výsledku rektální manometrie

8 Součástí klinické manifestace akromegalie není:

- a) kardiomyopatie
- b) kolorektální karcinom
- c) syndrom spánkové apnoe
- d) hypoglykemie

9 Mezi medikamentózní postupy při akromegalii nepatří používání:

- a) pegvisomantu
- b) domaninergrních agonistů
- c) somatostatinových analog
- d) růstového hormonu

10 Omega-3 polynenasycené mastné kyseliny máme zásadně doporučit:

- a) osobám se zvýšenou hladinou LDL cholesterolu
- b) všem pacientům po infarktu myokardu, vzhledem k jejich prokázanému účinku na snížení kardiovaskulární mortality
- c) pacientům s normální hladinou triglyceridů
- d) omega-3 polynenasycené mastné kyseliny nedoporučujeme

11 Dynamické zobrazení změn tvaru a pohybu jednotlivých struktur pánevního dna umožňuje:

- a) irigografie
- b) defekografie
- c) anální manometrie
- d) elektromyografie

12 Rostlinné steroly se mohou kombinovat s:

- a) omega -3 polynenasycenými mastnými kyselinami
- b) fibráty
- c) statiny
- d) se všemi výše uvedenými, neboť se sčítá jejich léčebný efekt

Správné odpovědi: 1. c 2. c, d 3. a, d 4. c 5. c 6. b 7. c 8. d 9. d 10. b, c 11. b 12. d