

Vážení čtenáři, na stránkách Interní medicíny pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Revmatoidní artritida nikdy nepostihuje tyto části skeletu:

- a) metakarpofalangeální klouby
- b) distální interfalangeální klouby
- c) kyčelní klouby
- d) lumbální páteř

2 Nejdůležitějším preventivním opatřením rozvoje kontrastní nefropatie je:

- a) podání acetylcysteinu
- b) adekvátní hydratace
- c) podání kyseliny askorbové
- d) uvážené indikování intervenčních výkonů

3 Vyšetření magnetickou rezonancí u pacientů s chronickou renální insuficiencí je:

- a) zcela bezpečné
- b) spojené s určitým rizikem akutního selhání ledvin
- c) kontraindikované
- d) zatížené rizikem nefrogenní systémové sklerózy

4 Blokáda RAAS by měla být součástí strategie léčby u pacientů s FS:

- a) s přítomnou arteriální hypertenzí
- b) u ICHS, srdečního selhání, po infarktu myokardu
- c) s přítomným diabetes mellitus
- d) všechny možnosti jsou správné

5 Na vzniku a trvání FS se podílí:

- a) elektrická remodelace síně a trigger aktivita
- b) strukturální remodelace s dilatací a fibrózou levé síně
- c) RAAS, který ovlivňuje jak elektrickou, tak i strukturální remodelaci
- d) všechny možnosti jsou správné

6 Od jaké tepové frekvence roste kardiiovaskulární riziko:

- a) 70/minutu
- b) 80/minutu
- c) 90/minutu
- d) 100/minutu

7 V případě zjištění trombofilního defektu:

- a) ihned zavádíme antikoagulační léčbu
- b) nemocného poučíme o riziku spojeném s daným defektem, upozorníme na možnost došetření defektu u mladších členů rodiny, v zátěžových situacích podáváme antitrombotickou prevenci
- c) nálezu si nemusíme všimnout, nemá klinický význam
- d) ihned nařídíme došetření celé rodiny

8 Co jsou neurogenní klaudikace a jak se projevují?

- a) Lokální bolesti v zádech objevující se pouze vestoji
- b) Bolesti v zádech vyzařující do dolních končetin vestoji a při chůzi, s úlevou ve flexi páteře
- c) Bolesti vyzařující do dolních končetin pouze při sezení
- d) Bolesti v zádech s jasnou úlevou při chůzi

9 Nejčastější příčinou, která vede ke vzniku postinfekční formy dráždivého tračníku, je

- a) bakteriální infekce
- b) virová infekce
- c) parazitární infekce
- d) všechny uvedené infekce

10 Hlavními permisivními faktory pro vznik trvalé poruchy funkce střev po proběhlé infekci jsou:

- a) přítomné autoimunitní choroby
- b) deprese a úzkostné neurózy
- c) stavy po operaci střev
- d) žádný z výše uvedených

11 Vyberte pravdivé tvrzení:

- a) Nejčastější příznak primárního hyperaldosteronizmu je rezistentní hypertenze
- b) Mezi typické příznaky nadprodukce katecholaminů patří poruchy metabolismu glukózy
- c) Nejvhodnější metodou diagnostiky stenózy renální tepny je duplexní sonografie
- d) Vyšetření kvality spánku by mělo být běžnou součástí vyšetření hypertonika

12 Nejúčinnější v léčbě revmatoidní artritidy jsou:

- a) antimalarika
- b) biologická léčba
- c) chirurgická léčba
- d) glukokortikoidy

Správné odpovědi: 1. b, d 2. a, d 3. b, d 4. d 5. d 6. a 7. b 8. b 9. a 10. b 11. b, d 12. b