

Vážení čtenáři, na stránkách Interní medicíny pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste přečetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Při vyšetření autoprotilátek jsou u nemocných s Churg-Straussové syndromem často nalézány

- a) antinukleární protilátky
- b) antofosfolipidové protilátky
- c) protilátky proti cytoplasmě neutrofilů
- d) anticentromerové protilátky

2 Při histologickém vyšetření nacházíme ve tkáních typicky

- a) vaskulitidu s perivaskulárními infiltráty lymfocytů
- b) vaskulitidu s perivaskulárními infiltráty eosinofilů
- c) vaskulitidu s perivaskulárními infiltráty neutrofilů
- d) vaskulitidu s perivaskulárními infiltráty monocytů

3 Výpotek u Churg-Straussové syndromu se vyskytuje

- a) v 1/3 případů, jedná se o exsudát s vysokým počtem eosinofilů
- b) v 1/3 případů, jedná se o transudát s vysokým počtem eosinofilů
- c) v 1/2 případů, jedná se o exsudát s normálním počtem eosinofilů
- d) v 1/2 případů, jedná se o exsudát s vysokým počtem eosinofilů

4 Somatické kmenové buňky jsou:

- a) přítomny pouze v embryonálních tkáních
- b) schopny sebeobnovy i diferenciací do zralých typů buněk
- c) přítomny v řadě tkání dospělého organismu
- d) schopny pouze diferenciací do zralých typů buněk, nikoliv sebeobnovy

5 Zavedení inhibitorů protonové pumpy do běžné klinické praxe při léčbě nevarikózního krvácení do horní části GIT vedlo ke snížení:

- a) letality akutního krvácení do HGIT
- b) incidence akutního krvácení do HGIT
- c) recidiv po endoskopickém ošetření pacientů s akutním krvácením do HGIT
- d) počtu podaných krevních převodů pacientům s akutním krvácením do HGIT

6 Cílová hodnota apolipoproteinu B pro nemocné s diabetes mellitus je:

- a) pod 1,1 g/l
- b) pod 1,0 g/l
- c) pod 0,9 g/l
- d) pod 0,8 g/l

7 Melatonin

- a) způsobuje ospalost
- b) prodlužuje 2NREM spánek
- c) stabilizuje přirozenou strukturu spánku
- d) většinou nemá nežádoucí účinky

8 Syndrom spánkové apnoe

- a) způsobuje hypertenzi
- b) je jen kosmeticko-sociálním problémem
- c) je charakterizován opakovanými zástavami dechu
- d) vyskytuje se jen u obézních

9 Při používání antitrombotik vylučovaných do organismu hlavně ledvinami je nutné monitorovat renální funkce:

- a) u osob vyššího věku
- b) u kardiaků
- c) u diabetiků
- d) u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení

10 Mezi faktory zvyšující riziko spinálního hematomu nepatří:

- a) významná obezita
- b) hormonální léčba
- c) anatomické odchylky páteře
- d) vyšší věk pacienta

11 Mezi nežádoucí účinky infuzního podávání epoprostenolu nepatří:

- a) trombocytopenie
- b) pruritus
- c) bolesti hlavy
- d) nauzea

12 Vyberte pravdivé tvrzení:

- a) Doba od manifestace prvních příznaků plicní arteriální hypertenze (PAH) do stanovení správné diagnózy se pohybuje pod 12 měsíců.
- b) Mezi vzácnější projevy onemocnění patří chrapot a kašel.
- c) U nemocných PAH je doporučováno očkování proti chřipce.
- d) Digitalis je běžnou součástí farmakoterapie PAH.

Správné odpovědi: 1. c 2. b 3. a 4. b, c 5. b 6. c 7. c, d 8. a, c 9. a, c, d 10. a, b 11. b 12. b, c