

Vážení čtenáři, na stránkách Interní medicíny pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 20 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Správné odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných článcích. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Nethiazidová sulfonamidová diuretika:

- a) zvyšují průtok ledvinou a upravují glomerulární filtraci
- b) působí podobně jako thiazidy s menším saluretickým účinkem
- c) jsou vhodná u nemocných s retencí tekutin a sodíku
- d) vyvolávají vyšší neurohumorální aktivaci než thiazidy v podobných dávkách

2 Diuretika v kombinační léčbě hypertenze můžeme používat:

- a) se všemi skupinami antihypertenziv
- b) se všemi skupinami antihypertenziv, ale nejvhodnější jsou ACE inhibitory, sartany
- c) kombinace s blokátory kalciových kanálů je kontraindikovaná
- d) nejvhodnější je kombinace diuretik a betablokátorů

3 Primární adrenokortikální insuficience se od sekundární liší v nedostatku následujících hormonů nadledvin:

- a) androgenů
- b) estrogenů
- c) mineralokortikoidů
- d) katecholaminů

4 Hyperpigmentace jsou typické pro:

- a) primární adrenokortikální insuficienci
- b) sekundární adrenokortikální insuficienci
- c) primární i sekundární adrenokortikální insuficienci
- d) pro autoimunitní polyglandulární syndrom 1. typu

5 U pacientů s adrenokortikální insuficiencí musíme podávat substituční dávku glukokortikoidů parenterálně v následující situaci:

- a) při opakovaném zvracení
- b) při profuzních průjmech
- c) u adrenokortikální (addisonské) krize
- d) ve všech uvedených případech

6 Při průjmech dochází

- a) k dehydrataci a hypokalemické alkalóze
- b) k dehydrataci a hypokalemické acidóze
- c) k respirační acidóze
- d) k hypochloremické alkalóze

7 Průjmy při choleře jsou:

- a) zánětlivé-exsudativní
- b) osmotické
- c) sekreční

d) motorické

8 Crohnova choroba může být lokalizovaná:

- a) jen v rektu
- b) jen tlustém střevě
- c) jen v tenkém a tlustém střevě
- d) v kterékoliv části trávicí trubice

9 Které potraviny jsou dobrým zdrojem folátu?

- a) ryby
- b) zelenina
- c) mléko
- d) ovoce

10 Optimální přísun folátu hraje důležitou roli v prevenci:

- a) kardiovaskulárních chorob
- b) defektu neurální trubice
- c) Alzheimerovy choroby
- d) nádorových onemocnění

11 Které léky snižují resorpci folátu?

- a) antibiotika
- b) antikonvulziva
- c) antiepileptika
- d) orální kontraceptiva

12 Příčinou mozkové hypoperfuze nebývá:

- a) plicní embolie
- b) ortostatická hypotenze
- c) hypoglykemie
- d) arytmie

13 Nejzávažnější z uvedených je synkopa:

- a) vasovagální
- b) kardiální
- c) situační
- d) cerebrovaskulární

14 Pneumocystová pneumonie je onemocněním, které se nejčastěji vyskytuje:

- a) u pacientů po chirurgickém výkonu na plicích
- b) u pacientů po přeléčení plicní tuberkulózy
- c) u HIV pozitivních pacientů
- d) u nedonošených novorozenců

15 Pro léčbu nekomplikované vulvovaginální kandidózy jsou vhodné/á:

- a) lokální polyenová antimykotika, např. nystatin nebo natamycin
- b) lipidové komplexy amphotericinu

- c) lokální azoly, např. klotrimazol
d) morfoliny, např. amorolfín

16 Echinokandiny působí na:

- a) buněčnou membránu hub
b) proteosyntézu hub
c) DNA hub
d) buněčnou stěnu hub

17 Zahajovací dávka dlouhodobě působícího analoga u DM2T před spaním je:

- a) 0,5 IU/kg/den
b) 0,2–0,3 IU/kg/den
c) 0,1–0,2 IU/kg/den
d) 0,2–0,4 IU/kg/den

18 Pokud se rozhodneme pro kompenzaci DM2T premixovanými inzulinovými analogy 3× denně, je nejčastěji nejvýhodnější poměr premixovaných směsí:

- a) 30/70
b) 50/50

- c) 25/70
d) 40/60

19 Hlavní význam pro snížení kardiovaskulárních rizik v souvislosti s užíváním kombinované hormonální antikoncepce mělo snížení dávky estrogenní složky:

- a) z 80 µg na 40 µg etinylestradiolu
b) z 50 µg na 30–35 µg etinylestradiolu
c) z 35 µg na 20 µg etinylestradiolu
d) z 30 µg na 15 µg etinylestradiolu

20 Gestagenní složka s antimineralokortikoidními účinky je:

- a) dienogest
b) nomegestrolacetát
c) drospirenon
d) norgestimát

Správné odpovědi: 1. b 2. b 3. c 4. a 5. d 6. b 7. c 8. d 9. b, d 10. b 11. b, c 12. c 13. b 14. c 15. a, c 16. d 17. c 18. b 19. b 20. c