

Vážení čtenáři, na stránkách Interní medicíny pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Mezi nejčastější chronické nemoci ledvin u nemocných vyššího věku patří:

- a) diabetická nefropatie
- b) hypertenzní nefropatie
- c) poškození ledvin při amyloidóze
- d) ischemická nefropatie

2 Které z následujících tvrzení odpovídá současným názorům na působení antioxidantů v lidském těle:

- a) oxidační stres nehraje při stárnutí významnou roli, proto jsou antioxidanty neúčinné
- b) dieta bohatá na ovoce a zeleninu působí preventivně proti rozvoji řady chronických chorob
- c) hlavní funkcí vitamínu C v těle je vychytávání reaktivních forem kyslíku
- d) suplementace beta-karotenem může zvyšovat riziko rakoviny plic u kuřáků

3 K udržení remise Crohnovy nemoci, která byla dosažena chirurgicky, neužíváme:

- a) kortikoidy
- b) mesalazin
- c) imunosupresiva
- d) antibiotika

4 K hlavním příčinám involuční senilní osteoporózy patří:

- a) nízké hladiny kalcitoninu ve vyšších dekádách
- b) nedostatečná sekrece parathormonu ve vyšším věku
- c) subklinický deficit vitamínu D
- d) nadbytek fosfátů v potravě

5 Pro kombinační hypolipidemickou léčbu statinem s fibrátem platí:

- a) je zásadně nevhodná a riziková
- b) současné podávání statinu s fenofibrátem významně zvyšuje plazmatické koncentrace fenofibrátu
- c) současné podávání statinu s gemfibrozilem nemá vliv na farmakokinetické interakce
- d) je efektivní zejména u smíšené dyslipidemie u metabolického syndromu nebo diabetes mellitus typ 2

6 Katabolický index vyjadřuje:

- a) poměr mezi příjmem a výdejem dusíku
- b) míru deplece kosterního svalstva
- c) poměr sérové koncentrace urey a kreatininu
- d) možný stav katabolizmu

7 Barronova metoda ošetření hemoroidů je velmi úspěšnou ambulantní metodou. Principem metody je:

- a) podvaz báze hemoroidálního uzlu
- b) naložení elastického kroužku na hemoroid
- c) vyříznutí hemoroidálního uzlu
- d) využití infračerveného paprsku

8 Karcinom příštítného tělíska:

- a) je běžná příčina primární hyperparatyreózy, podezřelá, ale nespecifická je mírná hyperkalcémie, lehce zvýšená hladina parathormonu v séru a nález malého tumoru v lokalitě příštítného tělíska
- b) je nejčastější příčina primární hyperparatyreózy, specifická je těžká hyperkalcémie, výrazně zvýšená hladina parathormonu v séru a nález velkého tumoru v lokalitě příštítného tělíska
- c) je vzácná příčina primární hyperparatyreózy, specifická je těžká hyperkalcémie, výrazně zvýšená hladina parathormonu v séru a nález velkého tumoru v lokalitě příštítného tělíska
- d) je vzácná příčina primární hyperparatyreózy, podezřelá, ale nespecifická je těžká hyperkalcémie, výrazně zvýšená hladina parathormonu v séru a nález velkého tumoru v lokalitě příštítného tělíska

9 Se sexuální dysfunkcí jsou asociovány:

- a) diabetes mellitus
- b) tyreopatie
- c) metabolický syndrom
- d) obezita

10 Nadbytek selenu v organismu se manifestuje:

- a) zažloutlou barvou pokožky
- b) lámavostí a deformacemi nehtů
- c) zapáchajícím dechem
- d) tendencí k migrénám

11 Riziko vzniku selhání ledvin se zvyšuje u:

- a) kuřáků
- b) hypertoniků
- c) těhotných žen
- d) pacientů po operaci prostaty

12 Mezi nežádoucí účinky sulfalazinu patří:

- a) poruchy spánku
- b) řídnutí kostí
- c) průjem
- d) bolesti hlavy

Správné odpovědi: 1. a, b, d, 2. b, d, 3. a, 4. c, d, 5. d, 6. c, d, 7. b, 8. d, 9. a, b, c, d, 10. b, c, 11. a, b, 12. c, d