

Vážení čtenáři, na stránkách Interní medicíny pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

**1 Při terapii testosteronem je nutné monitorovat:**

- a) hladinu testosteronu
- b) klinický stav prostaty
- c) hematokrit
- d) subjektivní pocit pacienta

**2 Na základě epidemiologických dat se v ČR připravuje přeočkování proti dávivému kašli u adolescentů:**

- a) od dovršeného 10. do dovršení 11. roku věku dítěte
- b) od dovršeného 9. do dovršení 10. roku věku dítěte
- c) dvouvalentní vakcínou společně s tetanem
- d) čtyřvalentní vakcínou obsahující také polio

**3 Shigelózy jsou provázeny průjmem:**

- a) osmotickým
- b) sekrečním
- c) zánětlivým
- d) motorickým

**4 Ischemickou kolitidu řadíme mezi:**

- a) nespecifické střevní záněty
- b) střevní záněty při celkových onemocněních
- c) onemocnění splachnického cévního řečiště
- d) nespecifikovatelné funkční střevní poruchy

**5 Základní doporučenou kombinací po infarktu myokardu je:**

- a) ACE inhibitor, sartan, betablokátor a statin
- b) ACE inhibitor, betablokátor, fibrát, verapamil
- c) blokátor RAAS, betablokátor, antiagregace, statin
- d) blokátor RAAS, statin, warfarin, verapamil

**6 Největším rizikem pohybové terapie u diabetiků 2. typu jsou:**

- a) hypoglykemie
- b) kardiovaskulární komplikace
- c) muskuloskeletární komplikace
- d) syndrom diabetické nohy

**7 Jedno tvrzení je chybné při inhalacích léků:**

- a) tlakové aerosolové dávkovače neobsahují od roku 2005 freony
- b) všechny práškové inhalátory zmírňují vznik chyb při inhalacích
- c) zdravotníci se nedopouštějí chyb při inhalacích
- d) ideální inhalační systém je ten, který je nezávislý na vdechu nemocného

**8 Při diagnostice snížené aktivity pohlavních žláz je hlavní:**

- a) symptomatologie
- b) laboratorní vyšetření
- c) klinické vyšetření
- d) dostatek času

**9 Mukozitida dutiny ústní může být komplikací:**

- a) chemoterapie
- b) aktinoterapie hlavy a krku
- c) léčby metotrexátem
- d) platí vše uvedené

**10 Pacient po chemoterapii se může komplikovat:**

- a) mukozitidou dutiny ústní
- b) herpetickou stomatitidou
- c) kandidózou sliznic dutiny ústní
- d) vším uvedeným

**11 Při mukozitidě dutiny ústní je zásadní:**

- a) výrazně omezit příjem ovoce
- b) udržet hygienu úst a chrupu
- c) zahájit obratem antibiotika
- d) aplikovat ledovou tříšť 3x denně

**12 V léčbě bolestivé menstruace se používají inhibitory cyklooxygenázy, které je nutno aplikovat:**

- a) cyklicky od druhé poloviny menstruačního cyklu
- b) 2 až 3 dny před očekávaným menstruačním krvácením
- c) kontinuálně v malých dávkách
- d) při zahájení menstruačního krvácení

Správné odpovědi: 1. a, b, c, d 2. a, b, c, d 3. c 4. c 5. c 6. b 7. c 8. a, b, c, d 9. d 10. d 11. b 12. b