

Vážení čtenáři, na stránkách Interní medicíny pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 DALM (Dysplasia associated lesion or mass) u ulcerózní kolitidy:

- a) je neškodná léze a nemusí být řešena
- b) je indikací ke kolektomii bez ohledu na stupeň dysplázie
- c) je spojena s vysokým rizikem vzniku kolorektální rakoviny
- d) u ulcerózní kolitidy se nevyskytuje

2 Česká republika patří mezi země s:

- a) nejvyšším podílem nemocných s časnými stadii karcinomu plic v době diagnózy
- b) průměrným výskytem pokročilých stadií karcinomu plic
- c) nejvyšším podílem pokročilých stadií karcinomu plic
- d) nejmenším výskytem karcinomu plic

3 Jak zjišťujeme srozumitelnost řeči?

- a) prahovou tónovou audiometrií
- b) ušním vyšetřením
- c) slovní audiometrií
- d) pohovorem s pacientem

4 Schválenou indikací pro dabigatran a rivaroxaban je v současnosti:

- a) profylaxe trombotických a tromboembolických příhod u operací velkých kloubů
- b) léčba trombotických a tromboembolických příhod u operací velkých kloubů
- c) profylaxe tromboembolických příhod při fibrilaci síní
- d) léčba akutních koronárních příhod

5 Výhodou přímých inhibitorů trombinu – dabigatranu a inhibitorů faktoru Xa – rivaroxabanu a apixabanu je:

- a) možnost perorálního podání
- b) spolehlivý účinek bez nutnosti monitorace
- c) rychlý nástup účinku (1–3 hod)
- d) spolehlivý efekt antidota

6 Pro posouzení efektu léčby Pagetovy choroby je nejdůležitější:

- a) normalizace radiologického nálezu
- b) normalizace scintigrafického nálezu
- c) normalizace hladin ALP
- d) normalizace denzitometrického nálezu

7 Kyselina zolendronová se používá v léčbě:

- a) kostních metastáz
- b) Pagetovy choroby
- c) osteoporózy
- d) všech výše uvedených

8 Kterým vyšetřením lze nejlépe posoudit stav vnitřních hemoroidů:

- a) klinickým vyšetřením
- b) digitálním vyšetřením per rektum
- c) rektoskopií
- d) anoskopií

9 Zúžení ledvinné tepny na podkladě ateromatózního procesu:

- a) se vyskytuje u drtivé většiny nemocných s ledvinným selháním
- b) je lokalizováno v proximální/ostiální části ledvinné tepny
- c) vyskytuje se asi u třech čtvrtin pacientů indikovaných k angioplastice ledvinné tepny
- d) v 80–90 % případů způsobuje nezvládnutelnou hypertenzi

10 Mezi klinické příznaky renovaskulární hypertenze nepatří:

- a) maligní zvrst hypertenze
- b) proteinurie vyšší než 1 g/24 hodin
- c) plicní edém
- d) akutní infarkt myokardu

11 Jakou část příčin CVI tvoří následky po hlubokých žilních trombózách:

- a) 40 %
- b) 60 %
- c) 80 %
- d) 95 %

12 U kterých látek je v literatuře uváděna účinnost na příznaky CVI:

- a) čistěná flavonoidní frakce (MPFF)
- b) sulodexid
- c) oxerutin
- d) výtažky z koňského kaštanu

Správné odpovědi: 1. b, c 2. c 3. c 4. a 5. a, b, c 6. c 7. d 8. d 9. b, c 10. b, d 11. c 12. a, c, d