

Vážení čtenáři, na stránkách Interní medicíny pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Která ze studií prokázala, že rychlý a výrazný pokles HbA_{1c} zvyšuje celkovou mortalitu pacientů s DM 2. typu?

- a) ADVANCE
- b) ACCORD
- c) HOPE
- d) DCCT

2 Vyberte pravdivé tvrzení pro syndrom toxického šoku:

- a) v klinickém obraze je v popředí postižení kloubů
- b) laboratorní parametry jsou nezářetlivé
- c) příznakový soubor pro STŠ tvoří: horečka, hypotenze, exantém, průjem, zvracení, zmatenost
- d) základním antibiotikem v léčbě STŠ je cefalosporin III. generace

3 Ke klinickému obrazu lymfedému patří:

- a) Darierův příznak
- b) Stemmerovo znamení
- c) Nikolského příznak
- d) Auspitzův fenomén

4 Mezi „chorobu modifikující farmaka“ (DMARDs) pro léčbu PsA s prokázanou účinností patří:

- a) sulfasalazin, metotrexát, azatioprin, plaquenil
- b) sulfasalazin, prednison, leflunomid, metotrexát
- c) leflunomid, cyklosporin A, metotrexát, sulfasalazin
- d) metotrexát, cyklosporin A, plaquenil, leflunomid

5 Psoriatická artritida je:

- a) samostatná nozologická jednotka v širším rámci zánětlivých artropatií
- b) samostatná nozologická jednotka řazená mezi spondylartritidy
- c) zvláštní forma revmatoidní artritidy bez přítomnosti revmatoidních faktorů, asociovaná s psoriázou
- d) samostatná nozologická jednotka řazená mezi spondylartritidy s odlišným histopatologickým obrazem od ostatních spondylartritid

6 U nefritidy při systémovém lupus erythematoses se prosazuje použití:

- a) rituximabu
- b) mykofenolátu-mofetilu
- c) natalizumabu
- d) alemtuzumabu

7 Účinek anti-TNF alfa látek u astmatu se dá očekávat:

- a) u většiny pacientů
- b) u mladé populace
- c) u pacientů s vysokou hladinou IgE
- d) u vybrané populace s refrakterní formou

8 Jaké jsou v praxi nejčastější příčiny aspirinové rezistence?

- a) polymorfizmy receptorů pro GPIIb-IIIa a COX-1
- b) nedostatečná compliance a interference s jinými nesteroidními antiflogistiky
- c) interakce trombocytů s jinými krevními buňkami
- d) zvýšený obrat destiček

9 Jaké bylo procento snížení nově vzniklé mikroalbuminurie ve studii ADVANCE?

- a) 12 %
- b) 15 %
- c) 18 %
- d) 21 %

10 Jaký byl pokles celkové mortality ve studii HYVET?

- a) 15 %
- b) 21 %
- c) 30 %
- d) 41 %

11 Co je to Wegenerova granulomatóza?

- a) chronická granulomatózní nekrotizující vaskulitida postihující především horní a dolní dýchací cesty a ledviny
- b) chronická granulomatózní nekrotizující vaskulitida postihující především kůži, oči, klouby, srdce a periferní nervy
- c) je histologicky charakterizována vaskulitidou, nejsou přítomny granulomy
- d) badiologicky se nejčastěji projevuje vznikem plicního výpotku

12 Syndrom Guillain-Barré se může objevit po infekci:

- a) salmonelou
- b) shigelou
- c) kampylobakterem
- d) rotaviry

Správné odpovědi: 1. b 2. c 3. b 4. c 5. b 6. b 7. d 8. b 9. d 10. b 11. a 12. c