

Vážení čtenáři, na stránkách Interní medicíny pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Která gastroprotektiva je vhodné podávat při dlouhodobém užívání nesteroidních antirevmatik?

- a) H₂ blokátory
- b) H₁ blokátory
- c) inhibitory protonové pumpy
- d) antacida

2 Která farmaka patří mezi léky 1. volby u neuropatické bolesti?

- a) antiepileptika
- b) SSRI inhibitory
- c) kortikoidy
- d) tramadol

3 Analoga GLP-1:

- a) jsou též nazývaná inkretinová mimetika
- b) zvyšují riziko hypoglykemie
- c) vznikají v pankreatu
- d) jsou spojeny s rizikem akutní pankreatitidy

4 Mezi red flags nepatří:

- a) bolesti hlavy sdružené s ranním zvracením
- b) silná bolest hlavy vzniklá při sexuální aktivitě
- c) silná pulzující bolest hlavy za levým okem vzniklá po dlouhém spánku
- d) nová bolest hlavy u 60letého muže

5 Jsou hybné poruchy u Parkinsonovy choroby jediným kritériem pro posuzování schopnosti řídit motorové vozidlo?

- a) Ano, protože ztuhlost či zpomalenost mohou zásadně ovlivnit pohyb volantem nebo přesun nohy na pedálech.
- b) Ano, ale jen u těch forem, kde dominuje hrubý klidový třes pravostranných končetin.
- c) Ne, je třeba komplexního posouzení celkového stavu, kromě hybného postižení zhodnotit i přítomnost spánkových poruch, kognitivního deficitu či psychotických projevů, zrakových poruch, vliv komorbidit i medikace.
- d) Ne, rozhodující je přítomnost či nepřítomnost psychotických projevů, zejména zrakových halucinací.

6 Od kterého stadia CHOPN dle GOLDu je možné v ČR podat pacientovi tiotropium?

- a) od lehkého stadia, tedy už od CHOPN I. stupně
- b) od těžkého stadia, tj. CHOPN III, když je FEV₁ pod 50 % náležitých hodnot
- c) od středně těžkého stadia, tj. CHOPN II, když je FEV₁ pod 80 % a nad 50 % náležitých hodnot
- d) od velmi těžkého stadia, tj. CHOPN IV, když je FEV₁ pod 30 % náležitých hodnot

7 Od kterého stadia CHOPN dle GOLDu je možné podat pacientovi inhalační kortikosteroid a LABA?

- a) od těžkého stadia, tj. CHOPN III, když je FEV₁ pod 50 % náležitých hodnot
- b) od středně těžkého stadia, tj. CHOPN II, když je FEV₁ pod 80 % náležitých hodnot
- c) od velmi těžkého stadia, tj. CHOPN IV, když je FEV₁ pod 30 % náležitých hodnot
- d) od středně těžkého stadia, tj. CHOPN II, ale pokud je aktuální hodnota FEV₁ pod 60 % náležitých hodnot

8 Které z uvedených opatření nelze doporučit k prevenci akutního poškození ledvin?

- a) dopamin
- b) korekce hypovolemie
- c) kličkové diuretikum
- d) vysazení nefrotoických látek

9 Substituční dávky hormonů štítné žlázy v těhotenství:

- a) vysadíme
- b) snížíme na polovinu
- c) zvýšíme o 1/4–1/2
- d) nezměníme

10 Je vhodné při posuzování schopnosti řízení motorových vozidel u Parkinsonovy choroby orientačně zhodnotit i kognitivní funkce?

- a) Ne, za svůj duševní stav nese každý řidič vlastní odpovědnost.
- b) Ne, Parkinsonova choroba je charakterizována především motorickým postižením a jiné funkce není třeba hodnotit.
- c) Ano, ale jen v případě, že na to upozorní příbuzní pacienta.
- d) Ano, u jedinců s Parkinsonovou chorobou může být schopnost řízení ovlivněna zhoršením kognitivních funkcí.

11 Ambrisentan:

- a) je duální antagonist receptoru pro endotelin
- b) urychluje metabolismus warfarinu
- c) nemá známé lékové interakce se sildenafilem
- d) je selektivní antagonist endotelinového receptoru ETA

12 Pozitivní vazodilatační test u pacientů s PAH:

- a) se vyskytuje u většiny pacientů s PAH
- b) indikuje léčbu sildenafilem
- c) indikuje léčbu prostanoidy
- d) indikuje léčbu vysokými dávkami blokátorů kalciových kanálů

Správné odpovědi: 1. c 2. a 3. a, d 4. c 5. c 6. c 7. d 8. a, c 9. c 10. d 11. c, d 12. d