

Vážení čtenáři, na stránkách Interní medicíny pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Nemocní s familiární kombinovanou hyperlipidemií mívají při vyšetření lipidogramu:

- a) smíšenou hyperlipidemii
- b) čistou hypercholesterolemii
- c) čistou hypertriglyceridemii
- d) mohou mít jakýkoliv výše uvedený nález

2 Nejčastější příčina bércevého vředu je:

- a) obliterující ateroskleróza tepen DKK
- b) chronická žilní insuficience
- c) diabetes mellitus
- d) bakteriální infekce kůže

3 K příznakům vředu žilní etiologie patří:

- a) klaudikace, bolesti při elevaci dolní končetiny
- b) atrofie kůže, chladná akra, vymizení ochlupení
- c) úleva při elevaci dolní končetiny, noční křeče
- d) hemosiderinová hyperpigmentace, lipodermatoskleróza, perimaleolární otok

4 Po 18 měsících léčby imatinibem v dávce 400 mg denně byla u nemocného s CML zjištěna následující odpověď: Cytogenetická: ve dvou mitózách z 20 hodnocených byl nalezen Ph chromozom, ostatní mitózy byly normální. Molekulární: 2,7 %. Jak byste hodnotil(a) tuto odpověď a jaký bude Váš doporučený další postup?

- a) suboptimální odpověď; lze pokračovat v dosavadní léčbě
- b) suboptimální odpověď; je nezbytné zvýšit dle tolerance dávku imatinibu až na 800 mg denně
- c) selhání; je nezbytné ukončit léčbu imatinibem a nasadit inhibitor tyrozinové kinázy 2. generace
- d) selhání; je nezbytné indikovat alogenní transplantace krvetvorných buněk

5 V průběhu onemocnění pacientů s B chronickou lymfatickou leukémií se často setkáváme s komplikacemi, které vyplývají z imunodeficitu nemocných. O které komplikace se jedná?

- a) infekční včetně oportunních infekcí
- b) autoimunitní komplikace, anémie, trombocytopenie
- c) duplicitní nádorová onemocnění
- d) všechny komplikace výše uvedené

6 Před dlouhodobým podáváním NSAID:

- a) se nedoporučuje vyšetření *Helicobacter pylori* (HP)
- b) doporučuje se vyšetření HP
- c) vyšetření HP je vhodné, ale v případě positivity HP není nutná eradikace
- d) je doporučena eradikace HP

7 Lékem volby těžké akutní alergické reakce s respiračními nebo kardiovaskulárními symptomy, jež může být způsobena bodnutím hmyzem, je:

- a) H1-antihistaminikum
- b) samostatně i.v. podávaný kortikoid
- c) adrenalin aplikovaný i. m.
- d) pouze beta2-mimetikum

8 Mezi indikace podávání betablokátorů nepatří:

- a) angina pectoris
- b) srdeční selhání se systolickou dysfunkcí levé komory srdeční
- c) primární prevence ischemické choroby srdeční u rizikových nemocných
- d) stav po infarktu myokardu

9 Praktický lékař ve své ordinaci známky onemocnění sítnice věkem podmíněnou makulární degenerací odhalit:

- a) může pomocí tzv. Amslerovy mřížky
- b) může pomocí krevních testů
- c) nemůže
- d) může odhalit pouze pokročilé formy, které již nelze léčit

10 Tzv. suchá (atrofická forma) věkem podmíněné makulární degenerace:

- a) nelze ovlivnit terapií vůbec
- b) lze léčit pomocí intravitreálních injekcí látek blokujících růstové vaskulární faktory
- c) její progresi může být zpomalena doplňky stravy bohatými na látky, jako je lutein nebo zeaxanthin
- d) má na OCT (optické koherenční tomografii) obraz akumulace tekutiny ve vrstvách senzorické sítnice

11 Vyberte nesprávné tvrzení: familiární kombinovaná hyperlipidemie je charakteristická:

- a) arteriální hypertenzí
- b) sníženým výskytem obezity
- c) častou přítomností inzulinové rezistence
- d) přítomností nealkoholické jaterní steatózy

12 Incidence akutního průjmu je celosvětově na jednoho obyvatele:

- a) 1–3 epizody ročně
- b) 3–5 epizod ročně
- c) 5–6 epizod ročně
- d) 7–8 epizod ročně

Správné odpovědi: 1. d 2. b 3. c, d 4. c 5. d 6. b, d 7. c 8. c 9. a 10. c 11. b 12. b