

Vážení čtenáři, na stránkách Interní medicíny pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Nejčastější formou kostní choroby v užším slova smyslu je:

- a) adynamická kostní nemoc
- b) fibrózní osteodystrofie
- c) smíšený typ kostní nemoci
- d) osteomalacie

2 Klíčovými faktory patogeneze MBD-CKD jsou:

- a) deficit D hormonu, hypofosfatémie, deficit kalcitriolu
- b) deficit D hormonu, hyperfosfatémie, deficit kalcitriolu
- c) hyperfosfatémie, hyperkalcémie, deficit kalcitriolu
- d) hypofosfatémie, hypokalcémie, deficit kalcitriolu

3 Mazi blokátory ADP receptoru nepatří:

- a) clopidogrel
- b) ticagrelor
- c) prasugrel
- d) aspirin

4 Rozdělení nádorů mozku podle jejich anatomické lokalizace na extra a intra-axiální je určeno podle jejich umístění vzhledem k této anatomické vrstvě:

- a) dura mater
- b) arachnoidea
- c) pia mater
- d) falx cerebri

5 Nejčastějším zdrojem metastáz do mozku jsou primární nádory z:

- a) prsu
- b) ledviny
- c) GIT
- d) plíce

6 Důvodem možného zvýšení tělesné teploty při podání antipsychotik nejpravděpodobněji může být:

- a) hypersenzitivita
- b) farmakologické působení léčiva
- c) idiosynkratická odpověď organismu
- d) kontaminace pyrogenem

7 Během léčby LMWH je doporučeno kontrolovat aXa:

- a) u všech pacientů 3. den po zahájení léčby
- b) u všech pacientů 3. den po zahájení léčby jen v případě podávání léčebných dávek
- c) u gravidních žen
- d) u pacientů se selháním ledvin

8 Extendované podávání LMWH v profylaxi TEN je doporučeno:

- a) po operaci pro frakturu proximálního femuru
- b) po totální náhradě kyčelního kloubu
- c) po velké operaci pro zhoubný nádor
- d) po laparoskopických operacích

9 Které z následujících tvrzení je pravdivé:

- a) u pacientů s diabetem nedochází k poruchám hojení
- b) u pacientů s diabetem je porušeno hojení povrchových ran, hojení hlubokých ran probíhá fyziologicky
- c) hojení povrchových ran není u diabetiků zpomaleno, ale hojení hlubokých ran, vyžadující tvorbu kolagenu, je výrazně porušeno
- d) všechny typy ran se u pacientů s diabetem nehojí

10 Metformin působí primárně:

- a) ve svalech
- b) v tukové tkáni
- c) v játrech
- d) v ledvinách

11 Užívání metforminu je zřídka provázeno rizikem:

- a) ketoacidózy
- b) laktátové acidózy
- c) zvýšením KV rizika
- d) poškozením B-buněk

12 Které z následujících tvrzení je nepravdivé:

- a) rány pacientů s diabetem jsou často infikovány větším počtem patogenů
- b) infikované chronické rány není třeba léčit antibiotiky
- c) diabetické ulcerace mohou být infikovány i mykotickými agens
- d) u pacientů s diabetem a chronicky infikovanými ranami často nebývají plně vyjádřeny ani lokální, ani celkové projevy infekce a sepse

Správné odpovědi: 1. c 2. b 3. d 4. c 5. d 6. c 7. c, d 8. a, b, c 9. c 10. c 11. b 12. b