

Vážení čtenáři, na stránkách Interní medicíny pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 Základním kritériem při indikaci neinvazivní ventilační podpory u nemocného v akutním stavu je:

- a) pH krve
- b) dechová a tepová frekvence
- c) stav vědomí
- d) nález na rtg hrudníku

2 Základní lék v prevenci a terapii osteoporózy je:

- a) stroncium ranelát
- b) parathormon
- c) kalcium a vitamin D
- d) bisfosfonát

3 Mezi kontraindikace perorálních bisfosfonátů nepatří:

- a) těžká nedostatečnost levin (GF pod 30 ml/min.)
- b) tachykardie
- c) hypokalcemie
- d) poruchy pasáže jícnem

4 V prvním kroku diagnostiky ICHS u žen se středním kardiovaskulárním rizikem a přítomností blokády levého Tawarova raménka na klidovém EKG je doporučeno provedení:

- a) koronarografie
- b) zátěžového EKG
- c) dobutaminové echokardiografie
- d) perfuzní scintigrafie myokardu

5 Vyberte nesprávné tvrzení o CT koronarografii v diagnostice ICHS u žen:

- a) senzitivita i specifita této metody je u žen nižší než u mužů
- b) je vhodnou metodou u méně symptomatických žen ve vyšším kardiovaskulárním riziku
- c) je běžně dostupnou diagnostickou metodou
- d) radiační zátěž je ve srovnání s klasickou koronarografií vyšší

6 Jakou charakteristiku má cysta štítné žlázy, u níž je vhodné provést sklerotizaci?

- a) solitární, malá, nehmátná cysta, na UZ objem pod 5 ml, ale pacient má pocit „cizího“ tělesa na krku
- b) velká cysta, na UZ objem nad 5 ml, v polynodózní strumě a pacient má pocit „cizího“ tělesa na krku
- c) solitární, velký komplexní uzel s malou cystickou dutinkou a benigním cytologickým nálezem
- d) solitární, velká, recidivující cysta, způsobující kosmetický defekt, s benigním cytologickým nálezem

7 Náhrada hlezna je indikovaná:

- a) při artritidě hlezna u RA
- b) při artróze hlezna
- c) při těžké deviaci a nestabilitě hlezna
- d) při nekróze talu

8 Které z pozdních komplikací diabetu neovlivňují hojení ran:

- a) diabetická gastroparéza
- b) diabetická nefropatie
- c) diabetická polyneuropatie
- d) makrovaskulární komplikace (ICHDK)

9 Které z následujících faktorů nelze během hojení ran terapeuticky ovlivnit:

- a) kompenzaci diabetu
- b) stav cév
- c) infekci
- d) některé kroky v kaskádě hojení rány

10 Jaká byla mortalita pacientů v uvedeném souboru u hemodynamicky nestabilních pacientů léčených trombolýzou a heparinem?

- a) byla vyšší ve skupině léčené trombolýzou
- b) byla vyšší ve skupině léčené heparinem
- c) byla stejná v obou skupinách
- d) trombolýza nebyla k léčbě použita

11 Jak se jmenuje studie, která porovnává trombolytickou léčbu vůči heparinu u hemodynamicky stabilních pacientů a co prokázala?

- a) studie se jmenuje PIOPED a prokazuje výrazně nižší mortalitu pacientů léčených trombolýzou
- b) žádná odpověď není správná
- c) studie se jmenuje MAPPET-3 a prokazuje, že mortalita pacientů léčených trombolýzou a heparinem byla přibližně stejná
- d) studie se jmenuje PISA-PED a prokazuje nižší mortalitu pacientů léčených heparinem

12 Mezi rizikové faktory karcinomu pankreatu patří:

- a) pití černé kávy
- b) diabetes a kouření
- c) pohlavní zdrženlivost
- d) obezita

Správné odpovědi: 1. a 2. c 3. b 4. c, d 5. a 6. d 7. a, b 8. a 9. d 10. b 11. c 12. b, d