

Vážení čtenáři, na stránkách Interní medicíny pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Správné odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných článcích. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 U kterého z následujících antiarytmik je největší riziko interakce s warfarinem?

- a) sotalhexal
- b) amiodaron
- c) vernakalant
- d) metoprolol

2 Hypokoagulační účinek warfarinu je dán inhibicí tvorby faktorů:

- a) trombinu, proteinu C
- b) proteinu C a S
- c) II, VII, IX, X
- d) VIII, V, II, IX

3 Nejčastějším nežádoucím účinkem kalcineurinových inhibitorů je:

- a) dřevňový útlum
- b) porucha funkce ledvin
- c) horečka
- d) alergické reakce

4 Inhibitory signálu prolygerace jsou účinné v:

- a) léčbě zánětlivé kardiomyopatie
- b) prevenci trombózy koronárního stentu
- c) prevenci a léčbě koronární nemoci po transplantaci srdce
- d) ovlivnění reperfučního poškození myokardu

5 S jakým rizikem může být spojeno současné užívání omeprazolu a klopidoogrelu?

- a) ztrátou účinnosti anti-sekrečního účinku IPP
- b) zesílením toxického působení metabolitů IPP
- c) zesílením anti-trombogenního účinku klopidoogrelu
- d) zesílením anti-trombogenního účinku klopidoogrelu

6 Kde je nejvyšší zdroj omega 3 mastných kyselin pro člověka?

- a) slunečnicový olej a drůbež
- b) zelenina a ovoce
- c) ryby a řepkový olej
- d) cereální výrobky

7 Které maso má nižší obsah tuku?

- a) hovězí kýta
- b) vepřové libové
- c) zvěřina
- d) maslová ryba

8 Přítomnost kvasinek v dutině ústní znamená:

- a) vždy kandidózu, jedná se o primárního patogena
- b) normální nález, jsou vždy převažující součástí fyziologické mikroflóry
- c) většinou běžný nález, v menších kvantech se jedná o častou součást fyziologické mikroflóry
- d) kontaminaci, kvasinky se na sliznici dutiny ústní nikdy nevyskytují

9 Odběr moči na mykologické vyšetření se provede:

- a) ze středního proudu do širokohrdlé nádoby s následným přelitím do zkumavky
- b) ze středního proudu po omytí zevního genitálu přímo do nádoby s pevným uzávěrem
- c) vždy zacévkováním po dezinfekci zevního genitálu
- d) u obězních osob suprapubickou punkcí

10 Echinokandiny se používají k léčbě:

- a) invazivní aspergilózy
- b) onychomikózy způsobených dermatofyty
- c) zygomikózy
- d) kandidózy, zejména rezistentních k flukonazolu

11 Mezi lokální antimykotika patří:

- a) echinokandiny
- b) amfotericin B
- c) klotrimazol
- d) žádné z uvedených antimykotik

12 Preventivní opatření proti krvácení vyžaduje nekombinovat NSA s:

- a) antikoagulancii
- b) nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové
- c) inhibitory protonové pumpy
- d) antagonisty H2 receptorů

Správné odpovědi: 1. b 2. c 3. b 4. c 5. d 6. c 7. c 8. c 9. b 10. d 11. c 12. a, b