

Vážení čtenáři, na stránkách Interní medicíny pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Správné odpovědi na otázky jsou v souladu s informacemi v příslušných článcích. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 U kterého onemocnění srdce je těhotenství pro vysoké riziko považováno za kontraindikované?

- a) u hypertrofické kardiomyopatie s lehkou obstrukcí výtokového traktu levé komory
- b) u prolapsu mitrální chlopně se středně významnou mitrální regurgitací a zachovanou systolickou funkcí levé komory
- c) u symptomatické aortální stenózy s plochou aortálního ústí pod 1,5 cm²
- d) u neoperovaného defektu síňového či komorového septa bez známek plicní hypertenze

2 Jaká je doporučená denní dávka vitaminu C?

- a) 8–10 mg
- b) 60–100 mg
- c) 200 mg
- d) 1000 mg

3 Která látka nepatří mezi vitaminy rozpustné ve vodě?

- a) biotin
- b) β-karoten
- c) niacin
- d) kyanokobalamin

4 Nejzhoubnější gynekologickým nádorem je:

- a) karcinom hrdla děložního
- b) karcinom ovaria
- c) karcinom dělohy
- d) karcinom vejcovodu

5 MikroRNA:

- a) vyskytují se pouze u rostlin
- b) jsou pouze u hlístice *Caenorhabditis elegans*
- c) mohou regulovat expresi mRNA, resp. proteinu
- d) nemají žádnou regulační funkci

6 Jaký je typický pacient s polymyalgia rheumatica?

- a) starší žena, aktivní porucha hybnosti v ramenních kloubech
- b) starší žena, pasivní porucha hybnosti ramenních pletenců
- c) starší žena, bolesti hlavy, porucha vizu, bolesti svalových pletenců
- d) starší žena, bolesti ramenních pletenců, vyrážka na ruku, ve výstřihu

7 Délka nutné profylaxe tromboembolické nemoci antikoagulanciem po náhradě kyčelního kloubu je:

- a) 2 týdny
- b) 3 týdny
- c) 28–35 dní
- d) 60 dní

8 Výhodou nových antikoagulancií (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) je zejména:

- a) parenterální aplikace jedenkrát denně bez nutnosti monitorace
- b) možnost podávání i u nemocných v chronickém renálním selhání
- c) možnost zrušení efektu protamin sulfátem
- d) perorální aplikace bez nutnosti monitorace

9 Mezi typické projevy dráždivého tračníku nepatří:

- a) zácpa
- b) průjem
- c) bolesti břicha
- d) anémie

10 Který z uvedených léků není obvykle používán k terapii dráždivého tračníku?

- a) sulpirid
- b) laktulóza
- c) omeprazol
- d) loperamid

11 Při arteriální hypertenzi průměrná hodnota krevního tlaku při domácím monitorování je vyšší nebo rovná:

- a) 135/85 mm Hg
- b) 130/80 mm Hg
- c) 125/80 mm Hg
- d) 120/80 mm Hg

12 Při domácím monitorování se krevní tlak měří 2×/den za sebou:

- a) 2 dny
- b) 3 dny
- c) 5 dnů
- d) 7 dnů

Správné odpovědi: 1. c 2. b 3. b 4. b 5. c 6. a 7. c 8. d 9. d 10. c 11. a 12. d